

Eupatorium Perfoliatum

Familia. *Compositae*.

Sinónimos. Latín: *Eupatorium perfoliatum* L., *Eupatorium connatum*, *E. salviaefolium*, *E. virginicum*. Español: hierba de la fiebre.

Descripción. Herbácea perenne caducifolia con una raíz horizontal. El tallo mide 30 a 120 cm de alto, es robusto, erecto, hispido, redondo y con ramas en la parte de arriba. Las hojas son opuestas, lanceoladas, con venas prominentes, rugosas, unidas a una base alrededor del tallo (conoperifoliales), aserradas, de color verde intenso por el haz y pubescentes por el envés, de 10 a 20 cm de largo y 2 a 5 cm de ancho en la base. Las flores de color blanco violáceo, aparecen desde agosto hasta octubre y están sobre 30 a 40 cabezuelas pedunculadas, algo pequeñas, que forman cimas ramificadas opuestas, axilares y terminales.

Hábitat. Norteamérica, desde Nueva Escocia y Dakota hasta Florida y Louisiana.

Historia. Introducida a la práctica homeopática por el doctor Williamson en 1845, *Trans. Am. Inst. Hom.*, 135. (Allen, T. F., *Enciclopedia de la Mat. Méd. Pura*, IV:234; X:520).

Partes utilizadas. Las hojas e inflorescencias, frescas.

Preparaciones:

Tintura ø : FM 1/10

100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable, regulada a 300 ml = 400 g

Agua destilada 200 ml

Alcohol 537 ml

Para obtener mil mililitros de tintura.

Dinamizaciones: 2x, con un volumen de tintura, cuatro volúmenes de agua destilada cinco volúmenes de alcohol; 3x y siguientes, con alcohol oficial.

Para preparación hahnemanniana: Regla 3